

www.ppat.ro.th

วันนี้
ไม่น่ากลัว
หากป้องกันตัว
และรู้เท่าทัน



www.ppat.or.th [PPATBANGKOK](https://www.facebook.com/PPATBANGKOK) [PPAT Channel](https://www.youtube.com/channel/UCPPATChannel) [@ppatofficial](https://www.line.me/tv/ppatofficial) [ppat.bkk](https://www.instagram.com/ppat.bkk)



สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โรคติดต่อ ทางเพศ สัมพันธ์




ช่องทางติดต่อ

เอชไอวี/เอดส์



เอชไอวี HIV (Human Immunodeficiency Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของ คน คือ เซลล์เม็ดเลือดขาวซีดีโฟร์ (CD4 cells) หรือ ทีเซลล์ (T cells) ซึ่งทำหน้าที่ป้องกัน ร่างกายจากการติดเชื้อ เมื่อเชื้อไวรัส HIV ทำลายเม็ดเลือดขาว CD4 จนมีปริมาณไม่ เพียงพอ เป็นสาเหตุให้เกิดอาการภูมิคุ้มกัน บกพร่อง

ซิฟิลิส




- สาเหตุ เกิดจากแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า Treponema pallidum ระยะฟักตัว ประมาณ 10 - 90 วัน
- การติดต่อ โดยการมีเพศสัมพันธ์ และ จากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์

โรคนี้ไม่แสดงอาการ ผู้ป่วยจะทราบ ว่า ติดเชื้อได้ต่อเมื่อมีการไปตรวจเลือด เช่น การตรวจเลือดเพื่อบริจาคเลือด หรือการตรวจคัดกรองในระยะฝากครรภ์ ซึ่งโรคนี้มียารักษาและสามารถรักษา ให้หายขาดได้ แต่ควรมีการตรวจ ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดู ระดับผลเลือด



หนองใน

สาเหตุ เกิดจากแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า Neisseria gonorrhoeae ระยะ ฟักตัว ประมาณ 3 - 5 วัน



อาการ


- ผู้ชาย จะมีการปัสสาวะขัด แสบ มีหนองไหล จากท่อปัสสาวะ บางรายมีอาการแตรกซ้อน เช่น เป็นฝีที่ปากท่อปัสสาวะ เป็นฝีที่พองที่ท่อ ปัสสาวะ ฝีที่บริเวณด้านข้างเส้นสองสสิ่ง ท่อปัสสาวะตีบตัน หากไม่ได้รับการรักษาเชื้อ จะลงไปสู่ถุงอัณฑะ ทำให้เกิดอาการอักเสบ อักเสบ อาจทำให้เป็นหมันได้
- ผู้หญิง ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หากมีอาการ จะมีตกขาว ไม่คัน มีการอักเสบที่ท่อปัสสาวะ ปัสสาวะแสบขัด ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจ กลายเป็นหมัน หรือทำให้ท้องนอกมดลูกได้

หูดหงอนไก่

สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส ที่ชื่อ ว่า Human papillomavirus ระยะฟักตัว ประมาณ 3 เดือน



อาการ เป็นติ่งเนื้ออ่อน สีชมพู คล้ายหงอนไก่



- ผู้ชาย มักพบที่ใต้หนังหุ้มปลายอวัยวะ เพศ เส้นสองสสิ่ง และอาจพบบริเวณ รอบ ทวารหนักในผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ทาง ทวารหนัก
- ผู้หญิง พบได้ที่ปากช่องคลอด พอง ช่องคลอด ปากมดลูก ทวารหนัก และ ฝัเย็บหูดจะเริ่มจากขนาดเล็กๆ และโตขึ้น เรื่อยๆ การตั้งครรภ์จะทำให้หูดโตเร็วกว่า ปกติ การที่คลอดผ่านทางช่องคลอด ของมารดาที่ป่วยเป็นโรคหูดหงอนไก่ การจะติดเชื้อจากมารดาได้